

Formulář: Hospitalizace

Anamnéza

- Odebratelná anamnéza (ano/ne)
- Hypertenze (ano/ne) (Léčená, neléčená nebo nově diagnostikovaná)
- DM (ano/ne) (Léčená, neléčená nebo nově diagnostikovaná)
- Chronická námahová AP dle CCS (výběr) (Potíže minimálně týden)
 - 0
 - 1
 - 1.5
 - 2
 - 2.5
 - 3
 - 3.5
 - 4
- Chronická dušnost NYHA (výběr) (Potíže minimálně týden)
 - 1
 - 1.5
 - 2
 - 2.5
 - 3
 - 3.5
 - 4
- IM (ano/ne)
- St.p.PCI (ano/ne)
- St.p.CABG (ano/ne)
- PM (ano/ne)
- ICD (ano/ne)
- CRT _ Biv (ano/ne)
- CMP nebo TIA v anamnéze (ano/ne)
- CHRI (ano/ne)
- Hepatopatie (ano/ne)
- ICHDK (ano/ne)
- CHOPN (ano/ne)
- Stav vědomí (výběr)
 - plně při vědomí
 - somnolence
 - sopor
 - koma
- KPCR před přijetím (ano/ne)
- CHSS (ano/ne)
- ICHS (ano/ne)
- DKMP (ano/ne)
- Chlopenní vada (ano/ne)
- Plicní embolie (ano/ne)
- HPLP (ano/ne)
- Fibrilace síní (ano/ne)
 - Permanentní
 - perzistentní
 - paroxysmální

- Flutter síní (ano/ne)
- Alkohol (ano/ne)
 - ano
 - ne
 - dřívě
- Kouření
 - ano
 - ne
 - dřívě

Vyšetření

- Výška (cm) (reálne číslo)
- Váha (kg) (reálne číslo)
- BMI (kalkulované)
- BSA (m²) (kalkulované)
- TKS (mmHg) (reálne číslo)
- TKD (mmHg) (reálne číslo)
- JVP (cm) (výběr)
 - < 6
 - 6 – 10
 - 10
- Otoky DKK (ano/ne)
- Otoky DKK – rozsah (výběr)
 - perimaleolární prosáknutí
 - do 1/3 bercul
 - do 2/3 bercul
 - po kolena
 - na stehna
 - do třisel
 - anasarka
- Chrůpky (výběr)
 - 0
 - < 1/3 plíc
 - 1/3 – 2/3 plíc
 - 2/3 plíc
- Ortopnoe (ano/ne)

EKG přijetí

- Frekvence (/min) (reálne číslo)
- Rytmus (výběr)
 - sinusový
 - fibrilace síní, flutter
 - junkční rytmus
 - stimulace
 - SVT
 - AVB II st.
 - AVB III st.
 - komorová tachykardie
- ST úsek (výběr)
 - elevace

- deprese
- nesignifikantní
- žádné
- raménková blokáda
- QRS (msec) (reálné číslo)
- QT (msec) (reálné číslo)
- QTc (msec) (reálné číslo)

Medikace chronická (alespoň týden)

- Medikaci lze zjistit (ano/ne)
- Antiagregace (ano/ne)
- Antiagregace – typ (výběr)
 - ASA
 - ADP blokátory
 - ASA + ADP blokátory
- Antikoagulace (ano/ne)
- ACEI (ano/ne)
- ACEI – typ (výběr)
 - Kaptopril
 - Enalapril
 - Lisinopril
 - Perindopril
 - Ramipril
 - Chinapril
 - Cilazapril
 - Fosinopril
 - Trandolapril
 - Spirapril
 - Moexipril
 - Imidapril
- ACEI – dávka (mg)
- AT2 (ano/ne)
- AT2 – typ (výběr)
 - Losartan
 - Eprosartan
 - Valsartan
 - Irbesartan
 - Kandesartan
 - Telmisartan
 - Olmesartan-medoxomil
- AT2 – dávka (mg)
- BB (ano/ne)
- BB – typ (výběr)
 - Atenolol
 - Bisoprolol
 - Metoprolol
 - Metoprolol SR
 - Metoprolol ZOK
 - Carvedilol
 - Acebutol
 - Betaxolol
- BB – dávka (mg)

- Ca blokátory (ano/ne)
- Ca blokátory – typ (výběr)
 - CAA DHP
 - CAA NDHP
- Diuretika (ano/ne)
- Verospiron (ano/ne)
- Thiazid (ano/ne)
- Thiazid – dávka (mg)
- Furosemid (ano/ne)
- Furosemid – dávka (mg)
- Statiny (ano/ne)
- Fibráty (ano/ne)
- PAD (ano/ne)
- Inzulin (ano/ne)
- Antiarytmika (I. a III. třída) (ano/ne)
- Digitalis (ano/ne)
- Propafenon (ano/ne)
- Amiodarone (ano/ne)
- Milurit (ano/ne)
- Digoxin (ano/ne)
- Nitráty p.o. (ano/ne)
- Katecholaminy (ano/ne) (Od RZP nebo při překladu)

Hospitalizace

- RTG klasifikace (Meszaros, modifikace Špinar) (výběr)
 - fyziologická plicní cévní kresba
 - rozšíření plicních hilů
 - redistribuce plicní cévní kresby se zachovalou kresbou v dolních plicních polích
 - redistribuce plicní cévní kresby s vymizelou kresbou v dolních plicních polích
 - intersticiální edém – Kerleyovy linie
 - intersticiální edém – parahilozní
 - intersticiální edém – extenze do periferie
 - intraalveolární edém jednostranný
 - intraalveolární edém oboustranný
- Fluidothorax (ano/ne)
- KTI (%)
- Ventilace neinvazivní (ano/ne)
- Selhání neinvazivní ventilace s nutností intubace (ano/ne)
- Ventilace invazivní (ano/ne)
- Hypotenze vyžadující léčbu (ano/ne) (katecholaminy, volumoexpanze)
- IABP (ano/ne)
- Kardiostimulace trvalá zavedená za této hospitalizace (ano/ne)
- Kardiostimulace dočasná zavedená za této hospitalizace (ano/ne)
- SKG známá - reSKG či revaskularizace není indikována (ano/ne)
- SKG za hospitalizace (ano/ne)
- Významná ICHS (výběr) (Stenoza minimálně nad 50% u tepny kalibru nad 2 mm)
 - není informace
 - ne
 - 1VD
 - 2VD
 - 3VD
- Onemocnění tepen (výběr)
 - RIA

- RC
- ACD
- RIA + ACD
- RIA + RC
- RC + ACD
- RIA +RC + ACD
- PCI za hospitalizace (ano/ne)
- CABG za hospitalizace (ano/ne)
- EF (RLVG) (%) (reálne číslo)
- HD/CVVH (ano/ne)
- Mechanická podpora (ano/ne)
- Implantace ICD (ano/ne)
- CRT (resynchronizační terapie) (ano/ne)
- Kandidát OTS (ano/ne) (zařazen na waiting list)
- OTS za hospitalizace (ano/ne)
- Akutní selhání ledvin (ano/ne) (nárůst kreatininu ≥ 150 za 24hod v průběhu hospitalizace nebo nutnost časně akutní HD u pacienta se vstupním kreatininem ≥ 200)
- Akutní selhání jater (ano/ne) (INR $\geq 1,5$ bez warfarinizace, současně vzestup ALT nebo AST nad 10násobek normy bez předchozího známého jaterního onemocnění)
- Akutní selhání plic (ano/ne) (hyposaturace $\leq 90\%$ nebo laborní známky globální respirační insuficience, nevysvětlitelné kardiálním selháním – infekce, zhoršení CHOPN, PNO)
- Re-IM za hospitalizace (ano/ne) (infarkt nebo re-infarkt s klinickým projevem a nárůstem kardiomarkerů v dalším průběhu hospitalizace, neplatí pro IM, který je vstupní událostí)
- Maligní arytmie (ano/ne) (setrvalá KT/FiKo/flutter komor s nutností akutní terapie)
- Resuscitace (ano/ne) (přímá nebo nepřímá srdeční masáž za hospitalizace)
- Úmrtí během hospitalizace (ano/ne)
- Příčina úmrtí (výběr)
 - kardiální
 - nekardiální
 - MODS/MOF

Biochemie

- Kreatinin vstup (umol/l) (reálne číslo)
- Kalkulované clearance vstupního kreatininu (ml/min)
- Kreatinin max (umol/l) (reálne číslo)
- Kalkulované clearance maximálního kreatininu (ml/min)
- Kreatinin výstup (umol/l) (reálne číslo)
- KM (umol/l) (reálne číslo)
- Urea vstup (mmol/l) (reálne číslo)
- Urea výstup (mmol/l) (reálne číslo)
- Na vstup (mmol/l) (reálne číslo)
- K vstup (mmol/l) (reálne číslo)
- Glykémie vstup (mmol/l) (reálne číslo)
- Glykémie lačná (mmol/l) (reálne číslo)
- CRP vstup (mg/l) (reálne číslo)
- CRP max. (mg/l) (reálne číslo)
- CRP výstup (mg/l) (reálne číslo)
- Cholesterol (mmol/l) (reálne číslo)
- HDL (mmol/l) (reálne číslo)
- LDL (mmol/l) (reálne číslo)
- TG (mmol/l) (reálne číslo)
- Troponin (výběr)
 - pozitivní
 - negativní

- neprovedeno
- Troponin - max. hodnota (ug/l) (reálne číslo)
- Hgb vstup (g/l) (reálne číslo)
- Hgb výstup (g/l) (reálne číslo)
- Htc – vstup (l/l) (reálne číslo)
- Htc – výstup (l/l) (reálne číslo)
- BNP (ABBOTT) vstup (pg/ml) (reálne číslo)
- BNP (ABBOTT) max. (pg/ml) (reálne číslo)
- BNP (ABBOTT) vystup (pg/ml)
- NT pro BNP vstup () (reálne číslo)
- NT pro BNP max. () (reálne číslo)
- NT pro BNP vystup () (reálne číslo)
- D dimery ()(reálne číslo)

Echo

- Vyšetření provedeno nebo známo z nedávné doby (ano/ne)
- EF (hodnota)
- Diastolická funkce (výběr)
 - nelze, není
 - normální
 - porucha relaxace
 - pseudonormalizace
 - restrikce
- Mi reg středně významná a významná (ano/ne) (Mi reg \geq II, ROA \geq 0.2cm², RF \geq 20%, RV \geq 25ml)
- Mi stenoza středně významná a významná (ano/ne) (MVA \leq 1.0cm²/m², Gmean \geq 9)
- Ao stenoza středně významná a významná (ano/ne) (AVA \leq 0.8cm²/m², Gmean \geq 30)
- Ao reg středně významná a významná (ano/ne) (Ao reg \geq II, PHT $<$ 300ms)
- TR (ano/ne) (Tri reg \geq II)
- Jiná významná vada (ano/ne)
- Plicní hypertenze (výběr) (žádná \leq 35; mírná \leq 50; střední \leq 65; těžká \geq 65)
 - nelze
 - ne
 - mírná
 - střední
 - těžká

Medikace - hospitalizace

- Noradrenalin (ano/ne)
- Adrenalin (ano/ne)
- Dobutamin (ano/ne)
- Dopamin (ano/ne)
- Inhibitory PDE (ano/ne)
- Levosimendan (ano/ne)
- Úvodní bolus levosimendanu (ano/ne)
- Maximální použitá dávka levosimendanu (výběr)
 - 0.05
 - 0.1
 - 0.2
- Neplánované ukončení podávání levosimendanu (ano/ne)
- Délka terapie (hodiny) (výběr)
 - \leq 12

- 12=24
- >=24
- Nitráty i.v. (ano/ne)
- Diuretika i.v. (ano/ne)
- Délka podávání i.v. diuretik (dny)
- Furosemid i.v. (ano/ne)
- i.v. kumulaativní dávka furosemidu (mg)

Medikace - propuštění

- Antiagregace (ano/ne)
- Antiagregace – typ (výběr)
 - ASA
 - ADP blokátory
 - ASA + ADP blokátory
- Antikoagulace (ano/ne)
- ACEI (ano/ne)
- ACEI – typ (výběr)
 - Kaptopril
 - Enalapril
 - Lisinopril
 - Perindopril
 - Ramipril
 - Chinapril
 - Cilazapril
 - Fosinopril
 - Trandolapril
 - Spirapril
 - Moexipril
 - Imidapril
- ACEI – dávka (mg)
- AT2 (ano/ne)
- AT2 – typ (výběr)
 - Losartan
 - Eprosartan
 - Valsartan
 - Irbesartan
 - Kandesartan
 - Telmisartan
 - Olmesartan-medoxomil
- AT2 – dávka (mg)
- BB (ano/ne)
- BB – typ (výběr)
 - Atenolol
 - Bisoprolol
 - Metoprolol
 - Metoprolol SR
 - Metoprolol ZOK
 - Carvedilol
 - Acebutol
 - Betaxolol
- BB – dávka (mg)
- Ca blokátory (ano/ne)

- Ca blokátory – typ (výběr)
 - CAA DHP
 - CAA NDHP
- Diuretika (ano/ne)
- Verospiron (ano/ne)
- Thiazid (ano/ne)
- Thiazid – dávka (mg)
- Furosemid (ano/ne)
- Furosemid – dávka (mg)
- Statiny (ano/ne)
- Fibráty (ano/ne)
- PAD (ano/ne)
- Inzulin (ano/ne)
- Antiarytmika (I. a III. třída) (ano/ne)
- Digitalis (ano/ne)
- Propafenon (ano/ne)
- Amiodarone (ano/ne)
- Milurit (ano/ne)
- Digoxin (ano/ne)
- Nitráty p.o. (ano/ne)
- Katecholaminy (ano/ne)

Propuštění

- Typ selhání (výběr) *de-novo srdeční selhání (denovo = nový vznik ASS u pacienta, u kterého nebyla dříve známá dysfunkce LK)*
 - akutní dekompenzace známého chronického srdečního městnání
 - de novo srdeční selhání
- Etiologie srdečního selhání - ČKS (výběr)
 - akutní dekompenzace chronického srdečního selhání
 - akutní koronární syndrom
 - hypertenzní krize
 - akutní arytmie
 - akutní chlopenní regurgitace
 - hemodynamicky závažná aortální či mitrální stenóza
 - akutní myokarditida
 - srdeční tamponáda
 - disekce aorty
 - kardiomyopatie po porodu
 - nekardiologické příčiny
 - syndrom vysokého výdeje
- Klasifikace ASS podle klinických projevů – ČKS (výběr)
 - akutní dekompenzace srdečního selhání
 - hypertenzní krize se srdečním selháním
 - akutní srdeční selhání s plicním edémem
 - kardiogenní šok
 - akutní srdeční selhání s vysokým výdejem
 - pravostranné srdeční selhání
- Klasifikace podle Killipa (výběr)
 - Bez srdečního selhání, bez známek kongesce.
 - Srdeční selhání s cvaem, chrůpky, známkami plicní hypertenze.
 - Těžké srdeční selhání s vlhkými chropy po celých plicích.

- Kardiogenní šok s hypotenzí < 90 mmHg, periferní vazokonstrikcí, oligurií, cyanózou atd.
- Datum přijetí (ddmmrrrr)
- Datum propuštění (ddmmrrrr)
- Doba hospitalizace (dny)
- Kam (výběr)
 - exitus
 - domů
 - jiná nemocnice ve stabilním stavu
 - jiná nemocnice v nestabilním stavu
 - kardiochirurgie
 - LDN
 - ARO
 - jiné
- Soběstačný (ano/ne)

Propuštění - vyšetření

- Váha (kg)
- BMI výstup (kg/m²)
- Obvod pasu (cm)
- Obvod boků (cm)
- TKS (mmHg)
- TKD (mmHg)
- TF (/min)
- NYHA (výběr)
 - I
 - II
 - III
 - IV
- Otoky DKK (výběr)
 - 0
 - perimaleolární prosáknutí
 - do 1/3 bérců
 - do 2/3 bérců
 - po kolena
 - na stehna
 - do třísel
 - anasarka
- Chrůpky (výběr)
 - 0
 - < 1/3
 - 1/3 – 2/3
 - 2/3
- JVP (cm) (výběr)
 - < 6
 - 6 – 10
 - 10
- Ortopnoe (ano/ne)
- DM (ano/ne)
- HT (ano/ne)
- HPLP (ano/ne)

- CMP (ano/ne)
 - 0
 - ischemická
 - hemorhagická
- ICHDK (ano/ne)
- DKMP (ano/ne)
- Plicní embolie (ano/ne)
- ICHS nově zjištěna (ano/ne)
- Tu srdce (ano/ne)
- NAP (ano/ne)
- Jiné onemocnění srdce (text)

Formulář: Follow up

- Stav pacienta (výběr)
 - žije
 - zemřel
 - nezjistitelný
- Datum úmrtí (ddmmrrrr)
- Datum posledního kontaktu (ddmmrrrr)

Formulář: Kvalita života

Minnesota Living with Heart Failure questionnaire

- Datum uskutečnění dotazníku (ddmmrrrr)

Did your heart failure prevent you from living as you wanted during the past month (4 weeks) by –

- causing swelling in your ankles or legs? (výběr)
 - 0 – no
 - 1 – very little
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5 –very much
- making you sit or lie down to rest during the day? (výběr)
 - 0 – no
 - 1 – very little
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5 –very much
- making your walking about or climbing stairs difficult? (výběr)
 - 0 – no
 - 1 – very little
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5 –very much
- making your working around the house or yard difficult? (výběr)
 - 0 – no
 - 1 – very little
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5 –very much
- making your going places away from the house difficult? (výběr)
 - 0 – no
 - 1 – very little
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5 –very much
- making your sleeping well at night difficult? (výběr)
 - 0 – no
 - 1 – very little
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5 –very much
- making your relating to or doing things with your friends or family difficult? (výběr)
 - 0 – no
 - 1 – very little

- 2
- 3
- 4
- 5 –very much
- making your working to earn a living difficult? (výběr)
 - 0 – no
 - 1 – very little
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5 –very much
- making your recreational pastimes, sports or hobbies difficult? (výběr)
 - 0 – no
 - 1 – very little
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5 –very much
- making your sexual activities difficult? (výběr)
 - 0 – no
 - 1 – very little
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5 –very much
- making you eat less of the foods you like? (výběr)
 - 0 – no
 - 1 – very little
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5 –very much
- making you short of breath? (výběr)
 - 0 – no
 - 1 – very little
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5 –very much
- making you tired, fatigued, or low on energy? (výběr)
 - 0 – no
 - 1 – very little
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5 –very much
- making you stay in hospital? (výběr)
 - 0 – no
 - 1 – very little
 - 2
 - 3
 - 4

- 5 –very much
- costing you money for medical care? (výběr)
 - 0 – no
 - 1 – very little
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5 –very much
- giving you side effects from treatments? (výběr)
 - 0 – no
 - 1 – very little
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5 –very much
- making you feel you are a burden to your family or friends? (výběr)
 - 0 – no
 - 1 – very little
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5 –very much
- making you feel a loss of self-control in your life? (výběr)
 - 0 – no
 - 1 – very little
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5 –very much
- making you worry? (výběr)
 - 0 – no
 - 1 – very little
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5 –very much
- making it difficult to you to concentrate or remember things? (výběr)
 - 0 – no
 - 1 – very little
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5 –very much
- making you feel depressed? (výběr)
 - 0 – no
 - 1 – very little
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5 –very much
- Physical dimension score (reálné číslo)
- Emotional dimension score (reálné číslo)

- MHLF score (reálné číslo)

Short Form 12 version 2

- Datum uskutečnění dotazníku (ddmmrrrr)
- Questions sample type (výběr)
 - acute
 - standart
- In general, would you say your health is (výběr)
 - excellent
 - very good
 - good
 - fair
 - poor

Does your health now limit you in this activities:

- Moderate activities, such as moving a table, pushing a vacuum cleaner, bowling, or playing golf (výběr)
 - limited a lot
 - limited a little
 - not limited at all
- Climbing several flights of stairs
 - limited a lot
 - limited a little
 - not limited at all

How much of the time have you had any of the following problems with your work or other regular daily activities as a result of your physical health:

- Accomplished less than you would like (výběr)
 - all of the time
 - most of the time
 - some of the time
 - a little of the time
 - none of the time
- Were limited in the kind of work or other activities (výběr)
 - all of the time
 - most of the time
 - some of the time
 - a little of the time
 - none of the time
- How much of the time have you had any of the following problems with your work or other regular activities as a result of your emotional problems: Accomplished less than you would like (výběr)
 - all of the time
 - most of the time
 - some of the time
 - a little of the time
 - none of the time
- Did work less carefully than usual (výběr)
 - all of the time
 - most of the time
 - some of the time
 - a little of the time

- none of the time
- How much did pain interfere with your normal work (including both work outside the home and housework)? (výběr)
 - not at all
 - a little bit
 - moderately
 - quite a bit
 - extremely

This questions are about how you feel and how things have been with you during the least 4 weeks.

- How much of the time have you felt calm and peaceful? (výběr)
 - all of the time
 - most of the time
 - some of the time
 - a little of the time
 - none of the time
- How much of the time did you have a lot of energy? (výběr)
 - all of the time
 - most of the time
 - some of the time
 - a little of the time
 - none of the time
- How much of the time have you felt downhearted and depressed? (výběr)
 - all of the time
 - most of the time
 - some of the time
 - a little of the time
 - none of the time
- How much of the time has your physical health or emotial problems interfered with your social activities (like visiting friend)? (výběr)
 - all of the time
 - most of the time
 - some of the time
 - a little of the time
 - none of the time

EuroQol - 5D

- Datum uskutečnění dotazníku (ddmmrrrr)
- Mobility (výběr)
 - 1 - no problems
 - 2 - some or moderate problems
 - 3 - extreme problems
 - 9 - missing
- Self-care (výběr)
 - 1 - no problems
 - 2 - some or moderate problems
 - 3 - extreme problems
 - 9 - missing
- Usual activities (výběr)
 - 1 - no problems
 - 2 - some or moderate problems

- 3 - extreme problems
- 9 - missing
- Pain / Discomfort (výběr)
 - 1 - no problems
 - 2 - some or moderate problems
 - 3 - extreme problems
 - 9 - missing
- Anxiety / Depression (výběr)
 - 1 - no problems
 - 2 - some or moderate problems
 - 3 - extreme problems
 - 9 - missing
- Best imaginable health state

Settle Angina Questionnaire

- Datum uskutečnění dotazníku (ddmmrrrr)

How much limitation have you had due to chest pain, chest tightness, or angina over the past 4 weeks by –

- Dressing yourself (výběr)
 - extremely limited
 - quite a bit limited
 - moderately limited
 - slightly limited
 - not at all limited
 - limited for other reasons or did not do the activity
- Walking indoors on level ground (výběr)
 - extremely limited
 - quite a bit limited
 - moderately limited
 - slightly limited
 - not at all limited
 - limited for other reasons or did not do the activity
- Showering (výběr)
 - extremely limited
 - quite a bit limited
 - moderately limited
 - slightly limited
 - not at all limited
 - limited for other reasons or did not do the activity
- Climbing a hill or a flight of stairs without stopping (výběr)
 - extremely limited
 - quite a bit limited
 - moderately limited
 - slightly limited
 - not at all limited
 - limited for other reasons or did not do the activity
- Gardening, vacuuming or caring groceries (výběr)
 - extremely limited
 - quite a bit limited
 - moderately limited

- slightly limited
- not at all limited
- limited for other reasons or did not do the activity
- Walking more than a block at a brisk pace (výběr)
 - extremely limited
 - quite a bit limited
 - moderately limited
 - slightly limited
 - not at all limited
 - limited for other reasons or did not do the activity
- Running or jogging (výběr)
 - extremely limited
 - quite a bit limited
 - moderately limited
 - slightly limited
 - not at all limited
 - limited for other reasons or did not do the activity
- Lifting or moving heavy objects (výběr)
 - extremely limited
 - quite a bit limited
 - moderately limited
 - slightly limited
 - not at all limited
 - limited for other reasons or did not do the activity
- Participating in strenuous sports (výběr)
 - extremely limited
 - quite a bit limited
 - moderately limited
 - slightly limited
 - not at all limited
 - limited for other reasons or did not do the activity
- Compared with 4 weeks ago, how often do you have chest pain, chest tightness, or angina when doing your most strenuous level of activity? (výběr)
 - much more often
 - slightly more often
 - about the same
 - slightly less often
 - much less often
 - I have had no chest pain over the 4 weeks
- Over the past 4 weeks, on average, how many times have you had chest pain, chest tightness, or angina? (výběr)
 - 4 or more times per day
 - 1-3 times per day
 - 3 or more times per week but not every day
 - 1-2 times per week
 - less than once a week
 - none over the past 4 weeks
- Over the past 4 weeks, on average, how many times have you had to take nitros for your chest pain, chest tightness, or angina? (výběr)
 - 4 or more times per day
 - 1-3 times per day
 - 3 or more times per week but not every day

- 1-2 times per week
- less than once a week
- none over the past 4 weeks
- How bothersome is it for you to take your pills for chest pain, chest tightness, or angina as prescribed? (výběr)
 - very bothersome
 - moderately bothersome
 - somewhat bothersome
 - a little bothersome
 - not bothersome at all
 - my doctor has not prescribe pills
- How satisfied are you that everything possible is being done to treat your chest pain, chest tightness, or angina? (výběr)
 - not satisfied at all
 - mostly dissatisfied
 - somewhat satisfied
 - mostly satisfied
 - highly satisfied
- How satisfied are you with the explanations your doctor has given you about your chest pain, chest tightness, or angina? (výběr)
 - not satisfied at all
 - mostly dissatisfied
 - somewhat satisfied
 - mostly satisfied
 - highly satisfied
- Overall, how satisfied are you with the current treatment of your chest pain, chest tightness, or angina? (výběr)
 - not satisfied at all
 - mostly dissatisfied
 - somewhat satisfied
 - mostly satisfied
 - highly satisfied
- Over the past 4 weeks, how much has your chest pain, chest tightness, or angina interfere with your enjoyment of life? (výběr)
 - It has severely limited my enjoyment of life
 - It has moderately limited my enjoyment of life
 - It has slightly limited my enjoyment of life
 - It has barely limited my enjoyment of life
 - It has not limited my enjoyment of life
- If you had to spend the rest of your life with your chest pain, chest tightness, or angina the way it is right now, how would you feel about this? (výběr)
 - not satisfied at all
 - mostly dissatisfied
 - somewhat satisfied
 - mostly satisfied
 - highly satisfied
- How often do you worry that you may have a heart attack or die suddenly? (výběr)
 - I can't stop worrying about it
 - I often think or worry about it
 - I occasionally worry about it
 - I rarely think or worry about it
 - I never think or worry about it

Medical Research Council Dyspnoea Scale

- Datum uskutečnění dotazníku (ddmmrrrr)
- Choose the number which best fits yours breath shortness.(výběr)
 - 0 - Not troubled with breathlessness except with strenuous exercise.
 - 1 - Troubled by shortness of breath when hurrying on the level or walking up a slight hill.
 - 2 - Walks slower than people of the same age on the level because of breathlessness or has to stop for breaths walking at own pace on the level.
 - 3 - Stop for breath after walking about 100 yards or after a few minutes on the level.
 - 4 - Too breathless to leave the house or breathless when dressing or undressing.

Socio-demographic background

- Have you experienced serious illness in you yourself? (ano/ne)
- Have you experienced serious illness in your family? (ano/ne)
- Have you experienced serious illness in caring for others? (ano/ne)
- What is your age?
- Are you male or female? (výběr)
 - male
 - female
- How does you smoking-status look like? (výběr)
 - a current smoker
 - an ex-smoker
 - a neversmoker
- Have you ever worked in health or social services?
- What is your current activity? (výběr)
 - an employer or self-employer
 - retired
 - student
 - seeking work
 - other
- Did your education continue after the minimum school leaving age? (ano/ne)
- Do you have a degree or equivalent professional qualification? (ano/ne)
- Your postcode